

## Návod k použití zdravotnického prostředku Sorbecta®

### 1. Určený účel

Zdravotnický prostředek s mechanickým účinkem. Přípravek je určen k léčbě průjmových onemocnění prostřednictvím mechanické adsorpce patogenních mikroorganismů a toxinů ve střevním lumen.

### 2. Obsah balení

Každé balení obsahuje 10 sáčků s práškem pro přípravu perorální suspenze.

### 3. Složení

Diosmectit 3g v každém sáčku.  
Pomocné látky: monohydrát glukózy, sukralóza, přírodní banánová příchut.

### 4. Dávkování

Děti do 1 roku užívají 2 sáčky denně po dobu 3 dnů, potom 1 sáček denně do odeznění potíží.

Děti nad 1 rok užívají 4 sáčky denně po dobu 3 dnů, potom 2 sáčky denně do odeznění potíží.

Dospělí užívají na začátku léčby 6 sáčků denně, dávku lze snížit na 3 sáčky denně podle stavu obtíží.

Léčba akutního průjmu u dětí by měla být spojena se včasným podáním orálního rehydratačního roztoku k zabránění dehydratace. U dospělých je v případě hrozící dehydratace rovněž vhodné použít orální rehydratační roztok.

### 5. Způsob použití

Obsah sáčku těsně před použitím nasype do sklenice a rozmíchejte v objemu 50 ml

vody, popřípadě rozmíchejte v dětské polotekuté stravě. Roztok je používán perorálně.

Přípravek používejte nejlépe mezi jídly.

### 6. Kontraindikace

Známa přecitlivělost na kteroukoliv ze složek přípravku.

### 7. Nežádoucí reakce

Nejsou známy žádné nežádoucí reakce spojené s užíváním tohoto přípravku. V případě předávkování se může objevit zácpa.

### 8. Zvláštní upozornění

- Absorpční vlastnosti tohoto přípravku mohou ovlivnit vstřebávání některých léků. V případě podávání léků souběžně s přípravkem Sorbecta® se poraďte se svým lékařem či lékárníkem.
- Nepřekračujte doporučené dávkování.
- Nikdy nepoužívejte tento přípravek po datu použitelnosti.

### 9. Uchování

Přípravek skladujte při pokojové teplotě do 25 °C a vždy ho uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

### 10. Poslední revize textu 11/2018

### 11. Výrobce

Wotania s.r.o.  
Kováků 1141/11, 150 00 Praha 5  
Česká republika  
Kontaktní email: info@wotania.eu  
Zdravotnický prostředek

banán



	Neznečišťujte životní prostředí		Kód dávky		Vhodné pro těhotné a kojící
	Zelený bod		Pro jedno použití		Od 0 let
	Horní mez teploty 25 °C		Nepoužívat, jestliže je balení poškozeno		Označení CE s číslem notifikované osoby
	Použit do data		Čtete návod k použití		

## Návod na použitie k zdravotníckej pomôcke Sorbecta®

### 1. Účel určenia

Zdravotnícka pomôcka s mechanickým účinkom. Pomôcka je určená na liečbu hnačkových ochorení, prostredníctvom mechanickej adsorpcie patogénnych mikroorganizmov a toxínov v črevnom trakte.

### 2. Obsah balenia

Každé balenie obsahuje 10 vrecúšok s práškom na prípravu perorálnej suspenzie.

### 3. Zloženie

Diosmektit 3g v každom vrecúšku. Pomocné látky: monohydrát glukózy, sukralóza, prírodná banánová príchuť.

### 4. Dávkovanie

Deti do 1 roka užívajú 2 vrecúška denne počas 3 dní, potom 1 vrecúško denne do odznenia ťažkostí.

Deti nad 1 rok užívajú 4 vrecúška denne počas 3 dní, potom 2 vrecúška denne do odznenia ťažkostí.

Dospelí užívajú na začiatku liečby 6 vrecúšok denne, dávku je možné znížiť na 3 vrecúška denne podľa stavu ťažkostí. Liečba akútnej hnačky u detí by mala byť spojená so skorým doplnením roztoku a zabránenie dehydratácie. U dospelých je v prípade hroziacej dehydratácie vhodné použiť aj orálny rehydratačný roztok.

### 5. Spôsob použitia

Obsah vrecúška tesne pred použitím nasypete do pohára a rozmiešajte v objeme 50 ml vody, prípadne rozmiešajte v detskej

polotekutej strave. Roztok je používaný perorálne. Prípravok používajte najlepšie medzi jedlami.

### 6. Kontraindikácie

Známa precitlivosť na ktorúkoľvek zo zložiek prípravku.

### 7. Nežiaduce reakcie

Nie sú známe žiadne nežiaduce reakcie spojené s užívaním tohto prípravku. V prípade predávkovania sa môže objaviť zápcha.

### 8. Osobitné upozornenia

- Absorpčné vlastnosti tohto prípravku môžu ovplyvniť vstrebávanie niektorých prípravkov. V prípade podávania liekov súčasne s prípravkom Sorbecta® sa poraďte so svojim lekárom alebo lekárnikom.
- Neprekračujte odporúčané dávkovanie.
- Nikdy nepoužívajte tento prípravok po dátume expirácie.

### 9. Uchovávanie

Prípravok skladujte pri izbovej teplote do 25 °C a vždy ho uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

### 10. Posledná revízia textu 11/2018

### 11. Výrobca












Wotania s.r.o.  
Kováků 1141/11, 150 00 Praha 5  
Česká republika  
Kontaktný email: info@wotania.eu  
Zdravotnícka pomôcka

banán



Viac informácií a diétne opatrenia nájdete na [www.sorbecta.eu](http://www.sorbecta.eu)



	Neznečisťujte životné prostredie		Kód dávky		Vhodné pre tehotné a dojčiacu ženu
	Zelený bod		Pre jedno použitie		Od 0 rokov
	Horná hranica teploty 25 °C		Nepoužívať, ak je balenie poškodené.	 2265	Označenie CE s číslom notifikovanej osoby
	Použitie do termínu		Čítajte návod k použitiu.		