

Příbalová informace k přípravku Sorbecta

1. Použití

Zdravotnický prostředek s mechanickým účinkem. Přípravek je určen k léčbě průjmových onemocnění, prostřednictvím mechanické adsorpce patogenních mikroorganismů a toxinů ve střevním lumen.

2. Obsah balení

Každé balení obsahuje 10 sáčků s práškem pro přípravu perorální suspenze.

3. Složení

Diosmectit 3g v každém sáčku.

Pomocné látky: monohydrát glukózy, sukralóza, přírodní banánová příchut.

4. Dávkování

Děti do 1 roku užívají 2 sáčky denně po dobu 3 dnů, potom 1 sáček denně do odeznění potíží.

Děti nad 1 rok užívají 4 sáčky denně po dobu 3 dnů, potom 2 sáčky denně do odeznění potíží.

Dospělí užívají na začátku léčby 6 sáčků denně, dávku lze snížit na 3 sáčky denně podle stavu obtíží.

Léčba akutního průjmu u dětí by měla být spojena se včasným podáním orálního rehydratačního roztoku k zabránění dehydratace. U dospělých je v případě hrozící dehydratace rovněž vhodné použít orální rehydratační roztok.

5. Způsob použití

Obsah sáčku těsně před použitím nasype do sklenice a rozmíchejte v objemu 50ml vody, popřípadě rozmíchejte v dětské polotekuté stravě. Roztok je používán perorálně.

Přípravek používejte nejlépe mezi jídly.

6. Kontraindikace

Známa přecitlivělost na kteroukoliv ze složek přípravku.

7. Nežádoucí reakce

Nejsou známy žádné nežádoucí reakce spojené s užíváním tohoto přípravku. V případě předávkování se může objevit zácpa.

8. Zvláštní upozornění

- Absorpční vlastnosti tohoto přípravku mohou ovlivnit vstřebávání některých léků. V případě podávání léků souběžně s přípravkem Sorbecta se poraďte se svým lékařem či lékárníkem.
- Nepřekračujte doporučené dávkování.
- Nikdy nepoužívejte tento přípravek po datu použitelnosti.

9. Uchovávání

Přípravek skladujte při pokojové teplotě do 25 °C a vždy ho uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

10. Poslední revize textu 09/2014

11. Výrobce

Wotania s.r.o.

Měšická 324, 250 63 Mratín

Kontaktní email: info@wotania.eu

Zdravotnický prostředek

